

UWAGA !!! Barszcz Sosnowskiego



Z początkiem lata zaczęły się pojawiać skupiska barszczu Sosnowskiego.

Barszcz Sosnowskiego jak powszechnie wiadomo jest silnie toksyczna oraz alergizująca. Chwast wydziela parzącą substancję, która może powodować zapalenie skóry oraz błon śluzowych. Jego parzące działanie nasila się podczas słonecznej pogody, wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza.

Wysoka temperatura oraz duże nasłonecznienie uwalnia toksyczne związki barszczu Sosnowskiego z rośliny w postaci lotnej. Związki te oprócz poparzeń skórnych, mogą powodować obrażenia dróg oddechowych, wymioty. W szczególnych przypadkach mogą prowadzić do uszkodzenia wzroku.

Często poparzenia barszczem Sosnowskiego są mylone z poparzeniami pokrzywy.



Skutki poparzenia barszczem Sosnowskiego

Najprostszą metodą usunięcia barszczu jest ręczne wrywanie rośliny. Koniecznie w ubraniu ochronnym i rękawicach.

Kolejnym sposobem jest chemiczne zwalczania barszczu poprzez stosowanie herbicydu Perzocyd 280 SL.. Opryski powinno prowadzić się w następujących przez okres od maja do późnej jesieni przez okres rozwoju rośliny.

Uwaga! - Usuwanie tej rośliny bez odpowiednich środków ostrożności może doprowadzić nawet do śmierci.

Apelujemy, aby przypadki wstąpienia rośliny zgłaszać do Władz miasta i usuwać jak najszybciej.

Źródło: www.ekologiczny-dom.com